[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

قبل از استفاده باید آب جوشیده و سپس مصرف شود.

متخصص اطفال بیمارستان حکیم خاطرنشان کرد: وبا بیماری منتقله از آب و غذای آلوده و روش انتقال آن مدفوعی -دهانی است لذا رعایت بهداشت فردی، نکته کلیدی پیشگیری از بیماری وبا می باشد . شستشوی اصولی دست ها بعد از توالت و قبل از غذا خوردن، شستشو و گندزدایی میوه و سبزیجات، پرهیز از خوردن غذاهای ناپخته و آب های غیرسالم در کاهش ابتلا به بیماری وبا بسیار موثر می باشد .

دکتر بقیعی ادامه داد : بیماری وبا در 75 درصد موارد بدون علامت، 20 درصد با اسهال خفیف و 5 درصد با اسهال شدید بروز می کند . اسهال در این بیماران نمایی شبیه به آب برنج دارد و به سرعت بیماران به خصوص کودکان و افراد سالمند را کم آب کرده و به سمت شوک می برد.

مدیر درمان دانشکده در پایان گفت : برای پیشگیری از همه گیری وبا، هر فرد بالای دو سال که به علت اسهال دچار کم آبی گردد و یا هر مورد مرگ در اثر اسهال از نظر وبا بررسی و نمونه گیری از مدفوع با «سوآپ رکتال» انجام می شود .

2 / 2
Phoca PDF